

AVVERTENZE ENDODONTICHE

TERAPIA CANALARE NON TERMINATA CON CAVITA' APERTA

Gentile paziente, siamo lieti di offrirLe alcune informazioni e raccomandazioni per spiegarLe quale tipo di intervento abbiamo appena effettuato.

- Abbiamo eseguito una medicazione per ridurre la carica batterica che ha colpito il Suo dente, è normale quindi avvertire un po' di dolore nei prossimi giorni, sia durante la masticazione che spontaneamente.
- Sul dente non è stato possibile mettere un'otturazione provvisoria a causa della forte infiammazione. Abbiamo solamente inserito una pallina di cotone simile a quelle che Le sono state date per evitare che il cibo possa occludere la cavità e causare un aumento del dolore.
- A causa dell'anestesia praticata la parte risulterà poco sensibile per qualche ora.

Per i motivi sopraelencati è bene non masticare nella zona interessata, in particolare nelle ore successive all'intervento per non procurarsi ferite alla mucosa.

Il fastidio al dente non scomparirà del tutto finchè non sarà completata la terapia canalare.

L'eventuale dolore potrà essere gestito con l'antidolorifico prescrittoVi dal medico.

Qualora il dolore non fosse risolvibile con la sola assunzione dell'antidolorifico è importante iniziare la terapia antibiotica prescritta.

In questo caso il dolore può essere associato ad un gonfiore della mucosa in corrispondenza del dente trattato.

Per qualsiasi problema o dubbio telefonate in ambulatorio e saremo lieti di darVi una risposta.